

## Αλλαγή κριτηρίων προτεραιοποίησης για τη Χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 24-12-2021 και ώρα 15:00, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υγείας, αναρτήθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής «Ιατρική Αίτηση για χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε Ασθενείς με COVID-19», σύμφωνα με τα νέα κριτήρια προτεραιοποίησης για χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη 253η συνεδρίασή της στις 22/12/2021.

Ειδικότερα, για την Ιατρική Αίτηση Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για ασθενείς με COVID-19 ισχύουν πλέον τα εξής:

- Αίτηση για χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενή μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ιατροί, **ανεξαρτήτως ειδικότητας.**
- Ο θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για έναν ασθενή, εφόσον ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:
  - Έχει ηλικία **12 ετών και άνω**
  - Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με **PCR test** το οποίο έχει διενεργηθεί **κατά το τελευταίο πενήνημερο**
  - Έχει **έναν τουλάχιστον** από τους ακόλουθους **παράγοντες υψηλού κινδύνου:**
    - Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων
    - Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
    - Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση
    - Κυστική Ίνωση
    - Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)

- Αιματολογικές κακοήθειες το τελευταίο έτος
- Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπειάς με Β-ειδικούς παράγοντες
- HIV με CD4<200 κύτταρα/μL
- Εγκυμοσύνη δεύτερου ή τρίτου τριμήνου
- Επί επιδημικών εξάρσεων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
- Ηλικία ≥ 65 ετών
- BMI > 35
- Χρόνια νεφρική νόσος
- Χρόνια Αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία
- Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
- Διαβήτης υπό θεραπεία
- Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (NYHA ≥ Class II)
- Χρόνια ηπατική νόσος
- Καρδιαγγειακή
- Αρτηριακή Υπέρταση υπό θεραπεία
- Θαλασσαιμία
- Δρεπανοκυτταρική αναιμία

- Σε περίπτωση που ο ασθενής νοσηλεύεται, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρήσει τον λόγο που αιτείται χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε νοσηλευόμενο ασθενή.

Πηγή: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση